Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Centrumlocatie

de patiënt prominent

U heeft zojuist gehoord dat er bij u een H.S.G. (hystero salpingo grafie) onderzoek gaat plaatsvinden. Waarschijnlijk is u al het één en ander verteld over hoe dat in zijn werk gaat. In deze folder staat alle informatie nog een keer op een rij. Heeft u na het lezen nog vragen, belt u dan gerust naar de afdeling Radiologie.

Waarom een H.S.G. onderzoek

De afkorting H.S.G. staat voor hystero salpingo grafie. Dit betekent: het zichtbaar maken van de baarmoeder en eileiders door middel van een röntgenfoto nadat er contrastvloeistof via de baarmoedermond in de baarmoederholte is gebracht. Bij dit onderzoek wordt er gekeken of er afwijkingen in de baarmoeder zijn en of de eileiders goed doorgankelijk zijn.

Contrastvloeistof

In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen, die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom is het belangrijk om te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is moet u dit bespreken met uw behandelend specialist. Wilt u het ook voor het onderzoek zeggen tegen de laborant of radioloog?

Voorbereiding thuis

Ongeveer een uur voor het onderzoek neemt u 2 tabletten Naproxen in, dit is een pijnstiller. U krijgt deze tabletten van de verpleegkundige op de polikliniek.
U wordt behandeld door een gynaecoloog met extra ondersteuning van een röntgen-laborant. Als u nog vragen heeft die betrekking hebben op het onderzoek kunt u die uiteraard op de dag zelf nog stellen aan de laborant(e) of de gynaecoloog.

Hystero Salpingo Grafie (HSG)

Waar vindt het onderzoek plaats
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie bevindt zich in gebouw Ca, tweede verdieping. U kunt zich melden bij de balie van de afdeling Radiologie. Uitplassen vlak voor het onderzoek is belangrijk voor uw gemak.

Het onderzoek
Nadat u uw onderkleding heeft uitgedaan in de kleedruimte, gaat u liggen op een tafel met beensteunen. Na het ontsmetten van de schaamlippen brengt de gynaecoloog een spreider (speculum) in en worden de schede en baarmoedermond ontsmet. Dan wordt er een dun buisje in de baarmoedermond geplaatst.
Dit kan een wat krampende pijn veroorzaken onder in de buik. Daarna wordt de contrastvloeistof in de baarmoeder en de eileider(s) gebracht. Soms is dit pijnlijk. Er worden direct foto's gemaakt. U kunt, samen met uw partner, alles volgen op een monitor. De pijn trekt meestal snel weer weg. Als de foto's zijn gelukt wordt het buisje uit de baarmoedermond gehaald. Wanneer u gaat staan kan de contrastvloeistof terugvloeien. U krijgt hiervoor een maandverbandje mee van de laborant. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

De uitslag
De gynaecoloog bestudeert de foto's en bespreekt met u de uitslag.

Bij verhindering of als u verlaat bent
Als u verhinderd bent en de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van te voren op (tenminste 2 dagen voor het onderzoek). Bent u verlaat op de dag van het onderzoek, meld dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 16.30 uur op telefoonnummer 010 704 56 39.

Tot slot
Deze folder geeft géén volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie die door de gynaecoloog is gegeven. Als u iets niet duidelijk is, vraag dit dan gerust aan de laborant(e) of de gynaecoloog.

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

© Erasmus MC - Patiëntencommunicatie - 12/11

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl

0000144