

Achternaam patiënt _____
Voorletter(s) _____
Geslacht ☐ V ☐ M ☐ X
Geboortedatum _____
BSN-nummer _____
Polisnummer patiënt _____
Referentienummer patiënt _____

Instelling _____
Plaats _____
Locatie _____
Adres _____
Factuuradres _____
Aanvragend arts _____
AGB-code arts _____
Direct telefoonnummer _____
Zorgmailadres _____

Gegevens monster

Afnamedatum _____
Afnametijdstip _____

*Na afname plasma direct invriezen. Moet
ingevroren in het EMC aankomen.
Er is 1 mL plasma per 5 bepalingen nodig*

Hemostase

- ☐ APTT
- ☐ Protrombinetijd
- ☐ Fibrinogeen Clauss
- ☐ Trombinetijd
- ☐ Factor II activiteit
- ☐ Factor V activiteit
- ☐ Factor VII activiteit
- ☐ Factor VIII activiteit (stolbepaling)
- ☐ Factor VIII activiteit (chromogeenbepaling)
- ☐ Antistoffen tegen Factor VIII (Bethesda assay) ¹
- ☐ Factor IX activiteit
- ☐ Factor IX activiteit (chromogeenbepaling)
- ☐ Antistoffen tegen Factor IX (Bethesda assay) ¹
- ☐ Factor X activiteit
- ☐ Factor XI activiteit
- ☐ Factor XII activiteit
- ☐ Factor XIII activiteit (chromogeenbepaling)
- ☐ Antistoffen tegen overige stollingsfactor (Bethesda assay) ¹
Betreft factor: _____

Trombose

- ☐ Lupus anticoagulantstest (totale pakket)
(Indien patiënt antistolling gebruikt dit vermelden)
Invullen gebruikte soort:
 - ☐ Stollingstesten
☐ APTT-Lupus _____
☐ dRVVT
 - ☐ Antistoffen
☐ Anti-cardiolipine (IgG en IgM)
☐ Anti-β-2-glycoproteïne-Ib (IgG en IgM)
- ☐ Proteïne C (indien activiteit verlaagd ook het antigeen bepalen)
 - ☐ Proteïne C activiteit
 - ☐ Proteïne C antigeen
- ☐ Proteïne S (indien activiteit verlaagd ook de antigenen bepalen)
 - ☐ Proteïne S activiteit
 - ☐ Proteïne S antigeen (totaal)
 - ☐ Proteïne S antigeen (vrij)
- ☐ APC-resistentie
- ☐ Antitrombine

Fibrinolyse

- ☐ Antiplasmin activiteit
- ☐ Plasminogeen

Fibrine degradatieproducten

- ☐ D-dimeren

Antistollingscontrole

- ☐ Anti-Xa activiteit
 - ☐ Ongefractioneerd (UFH)
LMWH
 - ☐ Dalteparine ☐ Fondaparinux
 - ☐ Danaparoid ☐ Nadroparine
 - ☐ Enoxaparine ☐ Tinzaparine
- ☐ Directe Xa remmer
 - ☐ Rivaroxaban ☐ Apixaban
 - ☐ Edoxaban
- ☐ Directe Trombine remmer
 - ☐ Dabigatran ☐ Argatroban

Von Willebrand diagnostiek

- ☐ VWF antigeen
- ☐ VWF activiteit
- ☐ Antistoffen tegen VWF (Bethesda assay) ¹
- ☐ VWF collageenbindingsactiviteit
- ☐ VWF multimeren analyse
(indien VWF parameters bepaald graag resultaten meesturen)
- ☐ VWF Normandy

Bloedplaatjesfunctie

- ☐ PFA (screening trombocytenfunctie)

1 x 2,7 mL citraatbloed ; niet afdraaien
Bloed moet binnen 2 uur na afname op laboratorium zijn
- ☐ Trombocyten aggregatie
- ☐ RIPA

Afname vindt plaats in het Erasmus MC Afspraak
maken met het Hemostaselaboratorium

DNA-onderzoek

- ☐ Factor V Leiden
- ☐ Protrombine-gen variant

2 x 2,7 mL citraatbloed ; niet afdraaien

Trombotische Trombocytopenische Purpura

- ☐ ADAMTS13 (indien activiteit <10% wordt ook de remmertiter bepaald)

Overig

- ☐ HIT (antistof tegen heparine-pf4)
- ☐ Analyse verlengde APTT e.c.i. (afname i.o.m. laboratorium)
- ☐ Emicizumab
Datum laatste gift: _____

¹⁾ Bij het bepalen van antistoffen tegen een stollingsfactor wordt ook altijd de activiteit bepaald