

Handleiding toestemmingsgesprek

In het kort

- We onderzoeken wat voor polsgips het beste de gebroken pols laat genezen.
- Het betreft de gipsspalk en een rondom onderarmgips. Beide behandelingen worden nu gebruikt.
- Als u meedoet wordt uw herstel nauwkeurig gevolgd met functieonderzoek en vragenlijsten.

Algemeen

- Het is niet bekend of een gipsspalk of rondom onderarmgips beter is bij een gezette polsbreuk. **Houdt dit ook tegenover de patiënt neutraal en laat niet een eigen voorkeur merken.**
- Momenteel worden beide behandelingen gebruikt in Nederland.
- De CAST studie gaat onderzoeken wat beter is; een spalk of een volledig onderarmgips.

Inhoud studie

- Bij de studie zullen we het herstel gedurende 1 jaar volgen met vragenlijsten, lichamelijk onderzoek van de pols en het beoordelen van de röntgenfoto's.
- Digitale vragenlijsten: De digitale vragenlijst ontvangt u 6 keer gedurende 1 jaar. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 10 minuten.
- Functieonderzoek: 3 maanden na de breuk wordt nauwkeurig het herstel van uw pols onderzocht door de onderzoeker.
- Ziekenhuisbezoeken: U krijgt de standaard controleafspraken over 1 week, 2 weken en wanneer het gips af gaat (4-6 weken). U krijgt één extra afspraak om de uiteindelijke functie na 3 maanden te onderzoeken.

Voor- en nadelen deelname

Voordelen

- U helpt patiënten in de toekomst met een vergelijkbare breuk.
- Uw herstel wordt extra goed gecontroleerd.

Nadelen

- Het invullen van de vragenlijsten kost gemiddeld 15 minuten per keer.