



U bent zojuist bij de KNO-arts en audioloog geweest op het CI-spreekuur. U (of uw kind) staat op de wachtlijst en bent geadviseerd om zich (of uw kind) voorafgaand aan de operatie bij uw huisarts te laten vaccineren. Uw huisarts ontvangt hierover ook een brief van uw behandelend KNO-arts. In deze folder staat alle informatie over de vaccinatie nog een keer op een rij.

Wij verzoeken u vriendelijk om de informatie op bladzijde 3 en 4 aan uw huisarts te geven.

Cochleaire Implantatie (CI) en hersenvliesontsteking

CI en hersenvliesontsteking

Hoewel geen precieze cijfers bekend zijn, lijkt het erop dat mensen met een cochleair implantaat (CI) een gering verhoogde kans op hersenvliesontsteking (meningitis) hebben. De kans op het krijgen van hersenvliesontsteking is zeer klein, ook na cochleaire implantatie. Omdat het om een ernstige ziekte gaat, heeft een team van artsen en wetenschappers aanbevolen te kiezen voor maximale veiligheid bij kinderen en volwassenen die een cochleair implantaat krijgen of dragen. Wij adviseren daarom aan alle (toekomstige) gebruikers van een cochleair implantaat om zich te laten inenten (vaccineren) tegen twee vormen van hersenvliesontsteking. Patiënten die op de wachtlijst staan voor een cochleair implantaat kunnen zich voorafgaand aan de operatie via de huisarts laten inenten. Het maakt niet uit hoe lang voor de ingreep dit gebeurt.

Vaccinaties bieden geen volledige bescherming tegen hersenvliesontsteking.

Ook na vaccinatie dient u alert te zijn op tekenen van een hersenvliesontsteking:

- hoge koorts
- hoofdpijn, vooral bij naar voren buigen van het hoofd (nekstijfheid)
- niet tegen licht kunnen
- overgeven
- verwardheid.

Zuigelingen kunnen zonder koorts en nekstijfheid een hersenvliesontsteking hebben.

Er is dan vaak sprake van:

- sufheid
- prikkelbaarheid (ongewoon huilen)
- algehele slapte, verlies van eetlust
- een grauwe kleur.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met het CI-team.

Contact

Telefoon: (010) 703 18 12

Fax: (010) 703 42 40

E-mail: ci@erasmusmc.nl

Website: www.erasmusmc.nl/kno

Informatie voor de huisarts

Patiënt is zojuist bij de KNO-arts en audioloog geweest op het CI-spreekuur. Patiënt staat op de wachtlijst en is geadviseerd om zich voorafgaand aan de operatie bij de huisarts te laten vaccineren. U ontvangt hier ook een brief over van de behandelend KNO-arts. Patiënt (of ouder/verzorger van patiënt) is gevraagd om deze informatie in te leveren bij de huisarts.

CI en hersenvliesontsteking

Hoewel geen precieze cijfers bekend zijn, lijkt het erop dat mensen met een cochleair implantaat (CI) een gering verhoogde kans op hersenvliesontsteking (meningitis) hebben. De kans op het krijgen van hersenvliesontsteking is zeer klein, ook na cochleaire implantatie. Omdat het om een ernstige ziekte gaat, heeft een team van artsen en wetenschappers aanbevolen te kiezen voor maximale veiligheid bij kinderen en volwassenen die een cochleair implantaat krijgen of dragen. Wij adviseren daarom aan alle (toekomstige) gebruikers van een cochleair implantaat om zich te laten inenten (vaccineren) tegen twee vormen van hersenvliesontsteking. Patiënten die op de wachtlijst staan voor een cochleair implantaat kunnen zich voorafgaand aan de operatie via de huisarts laten inenten. Het maakt niet uit hoe lang voor de ingreep dit gebeurt.

Aangeraden wordt te vaccineren tegen Pneumokokken (*Str. pneumoniae*) en tegen *Haemophilus influenzae* type B (HiB).

Vaccinatie tegen Pneumococcen:

Volwassenen en kinderen, *geboren voor 2007*:
éénmalige injectie met Pneumovax® 23 (0,5 ml).

Jongere kinderen zijn doorgaans al gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt hieronder het vaccinatieschema:

- Kinderen jonger dan 1 jaar: 3 injecties met Prevenar® 13 of Synflorix® (0,5 ml) met interval van 4 tot 8 weken.
- Kinderen tussen 12 en 15 maanden: één injectie Prevenar® (4^e dosis) en op de leeftijd van 24 maanden een tweede injectie Prevenar® 13 Synflorix® (5^e dosis).

Vaccinatie tegen Haemophilus influenzae type B:

Volwassenen en kinderen, *geboren voor 1993*:

éénmalige vaccinatie met Haemophilus influenzae B-vaccin (Act Hib® 0,5 ml).

Jongere kinderen zijn doorgaans al gevaccineerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt hieronder het vaccinatieschema:

- Drie doses die worden toegediend op respectievelijk 3, 4 en 5 maanden na de geboorte. Eén boosterdos is op de leeftijd van 11 maanden.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neemt u dan contact op met het CI-team.

Contact

Telefoon: (010) 703 18 12

Fax: (010) 703 42 40

E-mail: ci@erasmusmc.nl

Website: www.erasmusmc.nl/kno



www.erasmusmc.nl