

Om de zes à acht weken (per persoon verschillend) moet bij u de drain in de nier of galweg gewisseld worden om verstoppingen te voorkomen. In deze folder staat uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, belt u dan gerust naar de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Voor vrouwen

Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent. Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak. Na contrasttoediening mag 24 uur lang geen borstvoeding gegeven worden.

Contrastmiddel

In de contrastvloeistof zit een jodiumverbinding. Jodiumhoudende stoffen kunnen een allergische reactie veroorzaken bij mensen, die overgevoelig zijn voor deze stoffen. Daarom is het belangrijk te weten of u hier overgevoelig voor bent. Als dat zo is, moet u dit bespreken met uw behandelend specialist.

Wilt u het ook vóór het onderzoek zeggen tegen de laborant(e) of radioloog?

Vorbereiding

Om de drain te kunnen wisselen, wordt gebruik gemaakt van contrastvloeistof om het nierbekken (urine opvangsysteem) of de galwegen af te beelden.

Wisselen drain in de nier of galweg

PCN-drain (drain in de nier) of PTC-drain (drain in de galweg)

Vorbereiding thuis

Indien uw behandelend arts het verstandig vindt, kan het zijn dat u voorafgaand aan het wisselen van de drain antibiotica in moet nemen. Dit is om eventuele infecties te voorkomen. Uw arts zal u hierover van te voren informeren.

Het onderzoek

Bij het wisselen van de drain wordt gebruik gemaakt van de huidige insteekopening. Er wordt dus niet opnieuw geprikt. Als u op de röntgenkamer bent, wordt de pleister verwijderd en de huid en drain gedesinfecteerd (schoongemaakt). De laborant zal u met steriele doeken toedekken. Onder röntgendoorlichting zal de radioloog contrastvloeistof in de drain spuiten om te kijken of deze nog op de goede plaats zit. Door de drain zal daarna een dunne draad in de nier of galweg gelegd worden. De drain kan dan verwijderd worden, de draad blijft achter. Over deze draad kan nu de nieuwe drain op de juiste plek geschoven worden. Dit kan gevoelig zijn. Hierna wordt de draad weer verwijderd. Opnieuw wordt met contrastvloeistof de positie van de drain gecontroleerd. Als de drain op de juiste plaats zit, kan de drain worden afgeplakt en aangesloten worden op het opvangzakje.

Bij verhindering

Als u verhinderd bent, belt u dan het liefst zo ruim mogelijk van te voren op naar de (poli) kliniek waar u onder behandeling bent.

Tot slot

Wanneer u thuis problemen krijgt met de drain (bijvoorbeeld wanneer er geen gal of urine meer in het opvangzakje loopt, u pijn krijgt of de hechting losraakt), kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Radiologie:

- Tijdens kantooruren op telefoonnummer (010) 704 20 06. U wordt dan doorverbonden met de physician assistent van de unit interventie.
- Buiten kantooruren kunt u bellen naar het centrale telefoonnummer van het Erasmus MC: (010) 704 0 704 (vraagt u naar de dienstdoende radioloog, zoemer 35548).

